

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

LP-1-6-72397120

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL
25 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 206 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 141 - JUIN 1972

1er Juin 1972

VIGNE

MILDIU (Toutes régions) : Les conditions climatiques actuelles caractérisées par l'absence de pluies importantes ont entravé le développement du mildiou.

Il est cependant recommandé d'effectuer un nouveau traitement fongicide, dans la période du 3 au 8 juin avant le relevage des vignes, pour couvrir la végétation développée depuis la dernière application.

COCHYLIS - EUDEMIS : Le vol a été freiné par les basses températures du 15 au 25 mai, il se révèle faible ; il est trop tôt pour intervenir.

PYRALE : Rappel : L'attention est attirée sur le danger présenté actuellement (Beaujolais, Côte d'Or) dans les vignes sujettes aux dégâts de ce ravageur.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES & POIRES : Les premières pontes ont été déposées mais il est trop tôt pour traiter.

PETITS FRUITS

OIDIUM AMERICAIN DU GROSEILLIER SUR CASSISSIER : Quelques atteintes ont été notées à la fin de la dernière semaine aussi une première application est recommandée dans les cultures habituellement contaminées avec : benomyl : 30 g. de matière active/hectolitre
ou : dinocap : 25 g. " " " " (plus un mouillant).

Les traitements recommandés contre l'anthracnose du groseillier et du cassissier sont également actifs contre la rouille notamment : manèbe et mancozèbe.

La climatologie ayant souvent contrarié le bon résultat de la lutte contre les chenilles défoliatrices, on observe actuellement leur présence dans les feuilles enroulées. L'utilisation d'un organo-phosphoré par temps chaud (parathion par exemple) devrait limiter les dommages.

POMMES DE TERRE

MILDIU : Un premier traitement est conseillé dans les zones de primeurs sujettes à la maladie (zone d'Auxonne en particulier) pour protéger les cultures dont l'arrachage est retardé.

CULTURES MARAÎCHÈRES

Les premières manifestations du mildiou de l'oignon ayant été reconnues, la protection des cultures doit être assurée à l'aide de pulvérisations, de préférence pneumatiques, en utilisant :
- manèbe ou mancozèbe : 1 Kg,6 de matière active à l'hectare
ou -- propinèbe : 2 Kg,1 " " " "

/CONCOURS DE DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIU DE LA POMME DE TERRE /

La Station d'Avvertissements Agricoles ouvre un concours pour la détection des premières taches de mildiou. Les lauréats sont récompensés par une prime :

- de 50 Frs pour la première tache signalée dans la région
- et - de 30 Frs pour la seconde.

Pour obtenir cette prime, envoyer dès sa découverte, la feuille contaminée placée entre deux buvards humides, et le questionnaire ci-après dûment rempli :

Nom et prénom
Adresse
Commune où est située la parcelle Lieu-dit
Date de la découverte Signature

Dernière note : Bulletin n° 140 - Supplément 2

Les Ingénieurs chargés
des Avvertissements Agricoles :
J. PETIOT - E. TISSOT

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription phytosanitaire "Bourgogne et
Franche-Comté" : G. VARLET.

P 379